



ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

05. 08. 2020

ПРИКАЗ

№ 1394-12

г. Екатеринбург

Об организации медикаментозной профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19

С целью недопущения распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 среди населения Свердловской области и в соответствии с временными методическими рекомендациями «Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» версия 7 (03.06.2020)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Главным врачам медицинских организаций, подведомственных Министерству здравоохранения Свердловской области, обеспечить медикаментозную профилактику новой коронавирусной инфекции COVID-19 в соответствии с Приложением № 1.

2. Рекомендовать начальнику Управления здравоохранения Администрации город Екатеринбург Д.А. Демидову обеспечить в медицинских организациях муниципальной системы здравоохранения муниципального образования «город Екатеринбург» медикаментозную профилактику новой коронавирусной инфекции COVID-19 в соответствии с Приложением № 1.

3. Государственному бюджетному учреждению Свердловской области «Фармация»:

3.1. обеспечить закуп лекарственных препаратов для медикаментозной профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19 в соответствии с Приложением № 2;

3.2. организовать распределение лекарственных препаратов для медикаментозной профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19 по заявкам медицинских организаций, подведомственных Министерству здравоохранения Свердловской области и медицинских организаций муниципальной системы здравоохранения муниципального образования «город Екатеринбург»;

3.3. организовать передачу лекарственного препарата Иммард (гидроксихлорохин) 200 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой, № 30 (Ипка Лабораториз Лимитед) в количестве 70 упаковок, общей балансовой стоимостью 14616 руб. 00 коп., закупленного в рамках постановления Правительства Свердловской области от 22.06.2017 № 438-ПП «О мерах социальной поддержки

отдельных категорий граждан, проживающих в Свердловской области, по обеспечению лекарственными препаратами и медицинскими изделиями бесплатно и на льготных условиях по рецептам врачей в фармацевтических организациях за счет средств областного бюджета» по заявкам медицинских организаций, подведомственных Министерству здравоохранения Свердловской области и медицинских организаций муниципальной системы здравоохранения муниципального образования «город Екатеринбург» для проведения профилактики COVID-19.

4. Отделу финансового планирования и перспективного экономического развития Министерства здравоохранения Свердловской области предоставить целевую субсидию государственному бюджетному учреждению Свердловской области «Фармация» для осуществления закупа лекарственных препаратов для медикаментозной профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19 и возмещения расходов, произведенных из средств субсидии на выполнение закупа в соответствии с приложением № 2.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра здравоохранения Свердловской области И.И. Базите.

Министр



А.А. Карлов

Медикаментозная профилактика COVID-19

Рекомендованные схемы медикаментозной профилактики COVID-19:

1. Постконтактная профилактика у лиц при единичном контакте с подтвержденным случаем COVID-19.

Гидроксихлорохин 1-й день: 400 мг 2 раза (утро, вечер), далее по 400 мг 1 раз в неделю в течение 3 недель.

Противопоказания: повышенная чувствительность к гидроксихлорохину и к производным 4-аминохинолина; ретинопатия (в том числе макулопатия в анамнезе); детский возраст при необходимости длительной терапии (у детей имеется повышенный риск развития токсических эффектов); детский возраст до 6 лет (таблетки по 200 мг не предназначены для детей с "идеальной" массой тела менее 31 кг); беременность.

С осторожностью: при зрительных расстройствах (снижение остроты зрения, нарушение цветового зрения, сужение полей зрения), при одновременном приеме препаратов, способных вызывать неблагоприятные офтальмологические реакции (опасность прогрессирования ретинопатии и зрительных расстройств). При гематологических заболеваниях (в том числе в анамнезе). При неврологических заболеваниях, психозах (в том числе в анамнезе). При поздней кожной порфирии (риск обострения), псориазе (риск усиления кожных проявлений заболевания), при одновременном приеме препаратов, способных вызывать кожные реакции. При почечной и/или печеночной недостаточности, гепатите, при одновременном приеме препаратов, способных неблагоприятно влиять на функцию печени и/или почек (при тяжелых нарушениях функции почек или печени дозу следует подбирать под контролем плазменных концентраций гидроксихлорохина). При дефиците глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы. При желудочно-кишечных заболеваниях. При гиперчувствительности к хинину (возможность перекрестных аллергических реакций). При нарушении проводимости сердца (блокада ножек пучка Гиса/AV-блокада) и при гипертрофии обоих желудочков. При кардиомиопатии. При врожденном или приобретенном удлинении интервала QT и (или) следующих факторах риска удлинения интервала QT в анамнезе: заболевания сердца (например, сердечная недостаточность, инфаркт миокарда); проаритмические состояния (например, брадикардия с ЧСС менее 50 уд./мин); желудочковые нарушения ритма; нескорректированная гипокалиемия и (или) гипوماгнемия; одновременное применение лекарственных средств, удлиняющих интервал QT (повышение риска развития желудочковых нарушений ритма. Из-за риска развития гипогликемии гидроксихлорохин следует назначать с осторожностью

пациентам как принимающим, так и не принимающим гипогликемические препараты.

2. Профилактика COVID-19 у здоровых лиц и лиц из группы риска (старше 60 лет или с сопутствующими хроническими заболеваниями).

Рекомбинантный интерферон альфа-2b. Капли в каждый носовой ход 5 раз в день (разовая доза – 3000 МЕ, суточная доза – 15000-18000 МЕ) в течение 5 дней.

Приложение № 2 к приказу
 Министерства здравоохранения
 Свердловской области
 от 05.08.2020 № 1394-12

Наименование	Лек.форма, дозировка, упаковка	Здоровые лица и лица из группы риска (старше 60 лет или с сопутствующими хроническими заболеваниями)	Постконтактная профилактика у лиц при единичном контакте с подтвержденным случаем COVID-19
			Кол-во, уп.
Гидроксихлорохин	таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 200 мг №30		500
Интерферон альфа-2b	капли назальные, 10000МЕ/мл, флаконы с дозатором-капельницей 10 мл №1	49 500	